



НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ ЧЕРЕЗ:

- дверные ручки,
- места общего пользования,
- еду, посуду,
- душ, баню, бассейн,
- укусы кровососущих насекомых,
- поцелуй и прикосновения.



Министерство здравоохранения НСО



ГБУЗ Новосибирской области
“Центр по профилактике
и борьбе со СПИД”

ГБУЗ Новосибирской области
“Центр по профилактике и борьбе со СПИД”
г. Новосибирск, ул. Широкая, 15

тел. регистратуры:
301-48-79, 301-48-24

тел. отделения профилактики:
363-78-28

тел. горячей линии:
209-02-18(19)



www.o-spide.ru
www.spidnso.ru


**защити
СЕБЯ
сегодня**



**СПИД - Синдром Приобретенного
Иммунодефицита (вызван Вирусом
Иммунодефицита Человека).**

Правильное название этого
заболевания - ВИЧ-инфекция, а СПИД
является конечной стадией.

В настоящее время не найдено
лекарство, способное полностью
уничтожить вирус иммунодефицита в
организме человека. Поэтому лечение
ВИЧ-инфицированных направлено на
то, чтобы снизить скорость
размножения вируса и не допустить
развития СПИДа.



В Защите

3 СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА:

Через кровь:

- при употреблении внутривенных наркотиков;
- при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми остатками крови.

Половой путь передачи:

При незащищенном (без презерватива) проникающем половом контакте, даже если он единственный.

От матери к ребенку:

Во время беременности, родов, кормления грудным молоком (если беременная женщина с положительным анализом на ВИЧ своевременно обращается к врачу и получает препараты антивирусной терапии - это дает возможность/ помогает ребенку родиться здоровым).

В ЗАЩИТЕ



Определить наличие вируса в организме можно только с помощью специального анализа крови. Для достоверности тест необходимо сделать не раньше чем через 3 месяца после опасной в плане инфицирования ситуации.

Тест на ВИЧ-инфекцию можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также в Центре СПИД по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 15, тел. (383) 301-48-79.



www.o-spide.ru
www.spidnso.ru

ПРОСТО НУЖНО:

- воздержаться от сексуальных отношений, либо правильно использовать презерватив при каждом сексуальном контакте;
- использовать стерильный инструментарий при медицинских и прочих (тату, пирсинг, маникюре и т.д.) процедурах и манипуляциях;
- помнить о том, что алкоголь и наркотики изменяют состояние сознания, снижают способность человека трезво оценивать риск инфицирования.

ЭТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА:

Ранее обращение в женскую консультацию и постановка на учет до 12 недель беременности - это своевременное тестирование на ВИЧ/СПИД, наблюдение у врача, чтобы вы и ваш ребенок были в полном порядке.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволит своевременно назначить специальные препараты во время беременности, а также во время родов и новорожденному. Обязательно исключение грудного вскармливания для снижения риска передачи ВИЧ-инфекции.